


ValiaGyn

Probiotic

Κολπικές ταμπλέτες με προβιοτικά



Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
στην Ελλάδα



1. Ταυτοποίηση, σύνθεση και σκοπός του ιατροτεχνολογικού προϊόντος

Το Valiagyn Probiotic vaginal tablet είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν σε μορφή ταμπλέτας για κολπική χρήση, που περιέχει *Lactobacillus acidophilus*, γαλακτικό οξύ και εκχύλισμα σκόρδου χωρίς τη χαρακτηριστική οσμή. Είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν χρήσιμο στην προφύλαξη και τη θεραπεία των αιδοιοκολπικών μολύνσεων. Το Valiagyn Probiotic vaginal tablet μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη δύσοσμη λευκόρροια λόγω μη ειδικής κολπίτιδας όσο και μετά από θεραπεία με αντιβιοτικά για κολπίτιδα γνωστής αιτιολογίας, ως συμπλήρωμα στην αντιμικροβιακή θεραπεία για ανασύσταση της κολπικής βακτηριακής χλωρίδας, αποκαθιστώντας έτσι τις φυσιολογικές συνθήκες του κολπικού μικροπεριβάλλοντος.

1.1 Μηχανισμός δράσης

Η ουροκολπική μικροχλωρίδα χαρακτηρίζεται από ένα πολύπλοκο μικροβιακό οικοσύστημα που ασκεί μια φυσιολογική άμυνα ενάντια στα βακτήρια και την *Candida*, με τη φυσιολογική κολπική έκκριση να έχει ένα όξινο pH μεταξύ 3,8 και 4,5 και την οξύτητα να διατηρείται από ένα φυσιολογικό επίπεδο οιστρογόνων και από την υπάρχουσα βακτηριακή μικροχλωρίδα.

Η βακτηριακή χλωρίδα που αποικεί στο βλεννογόνο του κόλπου αποτελείται κυρίως από βακτήρια γαλακτικού οξέος (*Bacillus Doderlein*), τα οποία μεταβολίζουν το γλυκογόνο σε γαλακτικό οξύ, που είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση του όξινου περιβάλλοντος, το οποίο δεν ευνοεί τον αποικισμό και την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών.

Όταν η μικροβιακή ισορροπία αλλάξει προσωρινά από ορμονικούς παράγοντες (έμμηνος ρύση, εγκυμοσύνη, εμμηνόπαυση), από ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, ή από τη χρήση αντιβιοτικών, μπορεί να προκύψουν μολύνσεις από παθογόνα που μεταβάλλουν τη μικροβιακή σύνθεση της ουροκολπικής δομής. Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι κάψιμο, φαγούρα, δυσουρία και δύσοσμες κολπικές εκκρίσεις. Η ταμπλέτα Valiagyn Probiotic μόλις διαλυθεί στο κόλπο, απελευθεώνει μέσα σε λίγα λεπτά, τα λειτουργικά συστατικά:

- ✓ Το *Lactobacillus acidophilus* μπορεί να περιορίσει τον αποικισμό και την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών αποκαθιστώντας μια φυσιολογική κολπική μικροχλωρίδα.
- ✓ Το γαλακτικό οξύ, καθιστά το περιβάλλον του κολπικού βλεννογόνου ακατάλληλο για την ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών, μειώνοντας το κολπικό pH σε όξινη τιμή, μεταξύ 4 και 4,5. Αυτό μειώνει τη δυνατότητα φιλοξενίας στον κόλπο.
- ✓ Η παρουσία άοσμου εκχύλισματος σκόρδου, ως συμπληρωματική

ουσία, εξασθενεί και αποτρέπει τη δημιουργία βιοφίλμ, καθιστώντας τα παθογόνα πιο ευαίσθητα στη δράση των δύο κύριων συστατικών του προϊόντος.

1.2 Συστατικά

Κάθε ταμπλέτα περιέχει *Lactobacillus acidophilus*, γαλακτικό οξύ, εκχύλισμα σκόρδου χωρίς τη χαρακτηριστική οσμή.

Έκδοχα: μανιτόλη, άρωμα, βενζονικός γλυκερυλεστέρας, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, νατριοϋχος κροσκαρμελόζη, φυτικό στεατικό μαργαρίσιο, διοξειδίο του πυριτίου, βήτα-κυκλοδεξτρίνη

2. Συσκευασία

Ένα κουτί περιέχει 10 κολπικές ταμπλέτες

3. Δοσολογία και τρόπος χρήσης

Συστήνεται η χρήση μιας ταμπλέτας Valiagyn Probiotic, κατά προτίμηση το βράδυ πριν τον ύπνο, για 10 συνεχόμενες ημέρες.

Είναι σκόπιμο να ξεκινάει η θεραπεία δέκα ημέρες πριν από τον εμμηνορρυσιακό κύκλο ή/και αμέσως μετά το τέλος του. Με τη συμβουλή γιατρού, είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το Valiagyn Probiotic vaginal tablet για επαναλαμβανόμενους κύκλους.

Όταν αφαιρείτε την ταμπλέτα από τη συσκευασία προσέξτε ιδιαίτερα: μην πιέζετε στο κέντρο της κυψέλης καθώς η ταμπλέτα, δεδομένου του μεγέθους της, μπορεί να σπάσει.

Για να βγάλετε σωστά και με ασφάλεια την ταμπλέτα, ασκήστε μια μικρή πίεση στην άκρη της κυψέλης ή, εναλλακτικά πιάστε το αλουμίνιο στο πίσω μέρος του blister, ανασηκώστε το και αφαιρέστε την ταμπλέτα. Χρησιμοποιήστε τη ταμπλέτα αμέσως μετά την εξαγωγή από το blister. Η ταμπλέτα πρέπει να εισαχθεί βαθιά στον κόλπο, ώστε να διευκολυνθεί η ταχεία διάλυση.

4. Παρενέργειες

Τα συστατικά του Valiagyn Probiotic vaginal tablet είναι ασφαλή και καλά ανεκτά, όπως αποδείχθηκε από ειδικές εξετάσεις.

Σε δόσεις αναγκαίες για να επιτευχθεί ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα, δεν έχει ποτέ αναφερθεί περιστατικό παρενεργειών.

Το προϊόν δεν έδειξε καμία ερεθιστική επίδραση στον κόλπο, αλλά αν εμφανίσετε απρόβλεπτη υπερευαίσθησία στο προϊόν, συμβουλευτείτε το γιατρό σας και διακόψτε τη θεραπεία με το Valiagyn Probiotic vaginal tablet. Σε ορισμένες περιπτώσεις τις πρώτες ημέρες μπορεί να είναι εμφανιστεί μια ελαφριά φαγούρα που έχει την τάση να εξαφανίζεται μετά από 2-3 ημέρες θεραπείας.

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

5. Αλληλεπιδράσεις με φάρμακα

Μην χρησιμοποιείτε το Valiagyn Probiotic vaginal tablet μαζί με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή / και φάρμακα για κολπική χρήση, χωρίς να συμβουλευτείτε το γυναικολόγο σας.

6. Αποθήκευση

Το προϊόν περιέχει γαλακτοβάκιλλους πολύ ευαίσθητους στη θερμότητα. Διατηρήστε το Valiagyn Probiotic vaginal tablet σε ξηρό μέρος και μακριά από την απευθείας έκθεση σε θερμότητα ή πηγές φωτός. Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση αλλοιωμένης συσκευασίας ή blister. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω από 25 ° C. Αποφύγετε την έκθεση του προϊόντος σε θερμικό σοκ.

7. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη δοσολογία διότι μια υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ανεπιθύμητης ενέργειας.

Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν για περισσότερο από 30 ημέρες, αν τα συμπτώματα επιμεινούν, συμβουλευτείτε το γιατρό. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία ή η ταμπλέτα είναι αλλοιωμένα. Η παρουσία ελαφρού σκασίματος στην ταμπλέτα οφείλεται στα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην το χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση δυσανεξίας στο προϊόν. Μην το χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στα συστατικά. Κάθε ταμπλέτα είναι μίας χρήσης και θα πρέπει να ανοίγεται μόνο κατά τη στιγμή της χρήσης. Η ταμπλέτα είναι μίας χρήσης και για κολπική χρήση, δεν λαμβάνεται από το στόμα, μην την καταπιείτε.

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή θηλασμού για σωστή χρήση του Valiagyn Probiotic vaginal tablet.

8. Ημερομηνία λήξης

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν σε άθικτο περιέκτη, που έχει αποθηκευτεί σωστά.

9. Απόρριψη

Η διαχείριση ληγμένου προϊόντος, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων του τοπικού φορέα.

Μην απορρίπτετε σε καμιά περίπτωση το προϊόν ή τη συσκευασία στο περιβάλλον.



SIIT srl

Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Ιταλία

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
στην Ελλάδα



HEREMCO M. ΕΠΕ.

Ρήγα Φεραίου 27, Τ.Κ. 144 52 Μεταμόρφωση.
Τηλ. 210 5230217-8, www.heremco.gr



CE 0426

